

\\|/
マメ知識のハ
歯とお口のハ

DENTAL



NEWS  Vol.008
デンタルニュース

親知らず

- 親知らずとは？
- 親知らずの生え方
- 下顎智歯周囲炎
- 親知らずの治療




生える 年齢

「親知らず」とは？

歯は、あごの骨の中の歯胚とよばれる歯のもとからつくられます。乳歯の歯胚は妊娠7週目頃からできはじめ、永久歯の歯胚は出生する頃からできはじめます。

乳歯は生後6ヶ月頃から生えはじめ、3歳頃までに上下各10本ずつの20本が生えそろいます。

永久歯は第1大臼歯と前歯が6歳頃から生えはじめ、12歳頃までに永久歯上下28本が生えそろいます。そのあと早い人で14歳頃から、遅い人は20歳を過ぎてから「親知らず」は生えてきます。



🦷 早い人で14歳頃から生え始める

他の永久歯と比べ、生えてくるのがとても遅く、多くの場合は親元を離れてから生え始め、親の知らないうちに生えるというので「親知らず」と呼ばれています。

「親知らず」とは、歯列の一番奥の第3大臼歯のことを言います。

知恵がついてから生えるというので「知恵歯(ちえば)」・「智歯(ちし)」とも呼ばれています。




🦷 なぜ親知らずは正しく生えないの？

親知らずは、傾いて生えたり、横向きに生えたり、歯の一部だけしか出てこないなど正常に生えてこなかったり、歯はあってもアゴの骨の中に埋まったままで、歯が生えてこなかったりします。その原因はいくつかあると言われていますが、一番の原因は、現代人の食生活にあると考えられます。昔の人の食生活は硬いものが中心でアゴの骨が発達し、親知らずが生えるスペースが十分にありました。



ところが、現代人の食事は柔らかい食品が多く、結果としてアゴの骨が十分に発達せず、顎が小さくなってきています。そのため、永久歯がすべて生え揃うだけのスペースがなく、親知らずは正しい位置にきちんと生えないことが多いのです。




様々な 生え方

親知らずの生え方


親知らずには、さまざまな生え方があります。

- ①上下がきちんと咬み合い
正常に生えている状態




- ②上の歯は正常に生えているが、下の歯が正常に生えてこなかったり、欠損して歯がなかったりすることにより親知らずが他の歯より出すぎてしまう状態

食べかすがたまりやすく、歯茎が腫れたり、虫歯になりやすくなります。




- ③親知らずが途中で生え、前の歯に当たって完全に生えることがない状態




アゴの関節に負担がかかり、頬や歯茎を傷つけるようになります。

- ④水平に顎骨中に埋まった状態
(水平埋伏歯)




歯ならびを悪くしたり、第2大臼歯の歯根が吸収されたりします。

- ⑤親知らずが外側や内側に向かって生えている状態



- ⑥顎骨の中に埋まったままの状態



親知らずを放置しておく

正常に生えていない親知らずを放置しておく、さまざまな歯のトラブルを引き起こします。ここでは代表的なものを見てみましょう。

親知らずの痛みや腫れ

「親知らず」を放っておくと、「下顎智歯周囲炎」という病気になりやすくなります。

歯並びをおかしくする

一般的にすべての歯は“ゴードンの法則”といって、支えがなければ口の先端方向に傾いたり、移動しようとしています。歯列の最後に位置する「親知らず」が、正常に生えるスペースがない場合、常にすぐ前の第2大臼歯を圧迫しづけることになります。これにより、歯列全体が押されるため、歯ならびを悪くする原因の一つとなります。

矯正治療をする場合、歯科医が歯ならびをきれいに保つため、正常に生えてこない親知らずの抜歯を勧めるのはこのわけです。



歯根の吸収

第2大臼歯の親知らず側の歯根は、埋もれた親知らずによって絶えず圧迫され、溶けて親知らずに吸収されることがありますので、その時は第2大臼歯も抜歯しなければならないこともあります。

口臭の原因

口の中が不衛生になるため、ばい菌の温床となり、口臭の原因になります。



顎関節症を招く

親知らずの異常な生え方により、歯ならびがおかしくなり、そのために正しくない噛み合わせが習慣的となり、顎の関節に負担をかけてしまい顎関節症を招いてしまうことがあります。

親知らずの 治療

下顎智歯周囲炎

親知らずが半分だけ頭を出した状態では、親知らずとその前方にある歯との間に食べカスなどがたまりやすく、食べたものを押し込む結果となり、歯を磨いただけではなかなか取れません。こういう状態では、食べカスが口中の細菌によって腐敗し、周囲の組織に炎症をおこします。

この炎症が「下顎智歯周囲炎」です。

- 歯肉が親知らずにかぶさるようになっている場合も、親知らずと歯ぐきの間に食べカスがたまり炎症がおきやすくなります。

🦷 安易に考えない

下顎の親知らずの周りの組織は炎症が広がりやすく、感染を放置しておくと周囲に広がっていきます。

頬が腫れたり、顔全体が腫れ上がるなどの症状や痛みがおき、ひどくなると、のどにまで炎症が広がり、食べ物が飲みこみにくくなります。

炎症が広がると、口が開かなくなったり、さらに炎症が進むと、発熱や悪寒などの症状があらわれます。

- 症状等によっては入院が必要になることもありますので、親知らずの炎症と簡単に考えずに、腫れるようなことがあったらすぐに歯科医院等で診察を受けてください。




親知らずの治療法

「できるだけ歯を抜かない」という最近の歯科医療の傾向は、親知らずについても例外ではありませんが、他の歯よりもさまざまな理由で抜歯せざるを得ないケースも多いのが現状です。

抜歯する場合

①親知らずが正常に生えていないとき
(傾いたりしている時)



②ひどいむし歯になっているとき

神経（歯髄）も死んでいる可能性が高く、

放置すれば歯の根の先に細菌が巣をつくり、全身に感染がひろがることもあるため。

③歯周病になっているとき

- 歯がグラグラ動く
- 歯石
- 歯ぐきが腫れている



*放っておくと健康な歯まで悪化してしまうのを防ぐために抜歯します。

④むし歯や歯周病はさほどでもないが、あまりにも口の奥の方に親知らずが生えていて、噛みがきができないとき

⑤しっかりと生えきらずに、半分歯ぐきの中に埋まっていて、しばしばその周囲に痛みがでるようなとき（急に痛んだり、腫れたりする）

*親知らずの抜歯は、保険診療の対象になります。

抜歯後の注意点

- 頻繁にうがいをしない。 ●歯を抜いた所を舌などで触ったりしない。
- アルコールの摂取、運動は避け、入浴は軽いシャワー程度にする。
- 麻酔が切れるまでは食事はしない。
- 腫れても氷水や湿布などで冷やさない。
- 化膿止め（抗菌薬）は医師の指示通り、途中で止めずに服用する。



役に立つ
親知らず

 良い親知らずは大切に

ブラッシングによって清潔さを保っている、歯は生えきっていない状態だが一度も痛くなかったことがないなど、良い状態で保った親知らずは、将来奥歯を失った時に、ブリッジや義歯の支えにするなど治療に役立てることができる。



DENTAL  NEWS

Vol.008

親知らず